

# Criadero de perros San Marcos Terriers



---

## Enfermedades Comunes en los perros

---

### Contenido

Parvovirus

Moquillo

Hepatitis Canina

Parainfluenza

Leptospirosis

Coronavirus

Rabia

Bibliografía

## Parvovirus

La enteritis parvoviral canina o parvovirus canino ataca a perros de todas las edades, pero es más frecuente en cachorros menores de 6 meses. Afecta las células de la reproducción, tracto intestinal, médula ósea y corazón. Se transmite por vía aerosol, heces y alimentos contaminados. El periodo de incubación es de una a dos semanas, y los síntomas son deshidratación, diarrea sanguinolenta, vomito, depresión aguda, inapetencia, fiebre muy alta (41 C), dolor abdominal intenso. A veces los cachorros sufren de un síndrome de miocarditis. El perrito deja de mamar, grita y trata desesperadamente de inhalar; no se recupera y la muerte sobreviene de forma súbita o al cabo de unos meses.

Con **tratamiento** adecuado y de inmediato, la mayoría de perros afectados viven y logran inmunidad de por vida. La profilaxis consiste en vacunar al cachorro a las nueve semanas de edad, y luego aplicar un refuerzo al cabo de dos o 4 semanas hasta que tenga tres meses de edad. A los adultos se les aplican dos dosis separadas por un periodo de cuatro semanas.

## Moquillo

Enfermedad provocada por un virus específico de los perros y otros caninos, que es contagioso, resiste el congelamiento y puede difundirse por aire a un kilómetro de distancia del animal enfermo; se transmite por vía aérea. Los síntomas consisten en ascenso de temperatura, que dura uno a tres días, y después de algún tiempo sin fiebre se eleva por espacio de otra semana. Hay pérdida de apetito y secreción catarral de ojos y nariz. Puede complicarse con bronconeumonía, según las condiciones en que viva el perro.

El moquillo se caracteriza porque a los pocos días de presentarse las secreciones catarrales de los ojos y nariz, estos se vuelven amarillentos y pegajosos, al mismo tiempo presenta tos seca y, en ocasiones, aparecen pústulas en el abdomen. En la mayoría de casos sobreviene gastroenteritis, vomito con moco pegajoso y verdusco, úlceras en las encías y lengua. La diarrea debe ser combatida con suero fisiológico; de otra manera, el perro tiene pocas oportunidades de recuperarse. Más adelante pueden ocurrir convulsiones epiléptiformes en los que el perro está aturdido, cae al suelo, patalea, y cuando el ataque pasa le es difícil ponerse de pie. Los perros que padecen convulsiones rara vez salvan la vida. El periodo de incubación del virus es de una semana aproximadamente, aunque los síntomas en ocasiones no aparecen sino hasta dos o tres semanas luego de haberse contagiado. Debe consultarse de inmediato al veterinario, ya que el tratamiento es muy específico.

## Hepatitis Canina

Enfermedad muy contagiosa, específica del perro y que se produce por un virus (adenovirus). Se presenta en tres formas: ligera o subclínica, aguda y fulminante. El periodo de incubación es de 5 a 9 días. Se contrae directamente por medio de los excrementos de un perro enfermo o por orina; los síntomas de la forma ligera pasan casi inadvertidos ya que el perro afectado solo presenta inapetencia y poco interés en lo que lo rodea.

En forma aguda presenta fiebre de 40 °C que dura de uno a seis días, leucopenia, taquicardia, sed, diarrea sanguinolenta, amigdalitis, abdomen levantado por el dolor que sufre en el hígado y conjuntivitis; la luz le molesta, le lloran los ojos y a veces presenta endema en cabeza, cuello y tronco. En su forma fulminante el perro enferma súbitamente, presenta diarrea sanguinolenta y muere. La profilaxis consiste en la aplicación de una vacuna de virus vivo modificado entre las 10 y 16 semanas de edad. La vacuna de los laboratorios Intervel Norden DHL, conocida como la triple (moquillo, hepatitis, Leptospirosis) da muy buenos resultados y se debe administrar una vez al año. **La hepatitis canina no es contagiosa para el hombre, solo para otros perros.** Una vez que se recupera de la enfermedad, en 25% de los casos se presenta una opacidad de la córnea de color azul, pero desaparece al cabo de unos días. Ocasionalmente se presenta en los perros vacunados contra hepatitis.

### Parainfluenza

Es más conocida como toz de las perreras y se trata de una enfermedad sumamente contagiosa, por lo que si se va a dejar al perro en una pensión es recomendable que sea vacunado. **El síntoma es una toz fuerte, que si persiste puede causar bronquitis crónica.** En lugares en donde se presenta la Parainfluenza es aconsejable vacunar con DHLPP, conocida como la cuádruple (moquillo, hepatitis, Leptospirosis y Parainfluenza) entre las 14 y a6 semanas de edad, seguido por un refuerzo a las tres o cuatro semanas, y después cada año.

### Leptospirosis

En la especie canina esta enfermedad es producida por una bacteria, la espiroqueta *L. canicola* en la mayoría de casos; afecta a los perros de cualquier edad y tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días. Se contagia por medio del agua o comida contaminada por orina infectada o ratas. La enfermedad se presenta casi siempre de forma ligera, pero también puede aparecer de forma aguda. **Los síntomas son:** dolor en los riñones, que hace que el perro camine encorvado o no quiera pararse; depresión, temblores musculares, fiebre de (39.5 °C a 40.5 °C, la cual a los días desciende por debajo de lo normal, de 38.5 °C), vómitos, diarrea sanguinolenta y orina frecuente.

**El tratamiento** incluye la aplicación de suero glucosado a 5% y suero isotónico subcutáneo o intravenoso, complejo B intramuscular y penicilina intramuscular. La profilaxis consiste en evitar que el perro muerda a una rata o entre en contacto con las heces de roedor. La vacuna contra la Leptospirosis viene combinada con la del moquillo y la hepatitis, y se recomienda la de laboratorio Intervet.

### Coronavirus

Una infección por coronavirus canino (CCV) es una enfermedad intestinal sumamente contagiosa que puede ser encontrada en perros en todo el mundo. Este virus en particular es específico de los perros, tanto salvajes como doméstico. El coronavirus se reproduce dentro del intestino delgado y es limitado a las dos terceras partes superiores del intestino delgado y los

nódulos linfáticos locales. Una infección CCV es considerada generalmente como una enfermedad relativamente suave con síntomas esporádicos, o ninguno en absoluto. Pero, si una infección CCV ocurre simultáneamente con una infección viral de parvovirus canino, o una infección causada por otro patógeno intestinal (entérico), las consecuencias pueden ser mucho más serias.

**Los síntomas** de una infección CCV varían. En perros adultos, la mayoría de las infecciones no mostrarán síntomas. A veces, puede ocurrir un sólo indicio de vómitos y unos días de diarrea explosiva (líquida, amarilla, verde o naranja). La fiebre generalmente es muy rara, mientras que la anorexia y la depresión son más comunes. Ocasionalmente, un perro infectado también puede experimentar algunos leves problemas respiratorios. Los cachorros pueden presentar diarrea prolongada y deshidratación, y son los que más peligro tienen de desarrollar complicaciones serias con este virus.

Hay una **vacuna disponible** para proteger a los perros de este virus. Normalmente es administrada solamente en perros de espectáculo y cachorros, ya que ellos tienen sistemas inmunológicos no desarrollados y son más vulnerables. Como el coronavirus canino es una infección sumamente contagiosa, la mejor prevención es inmediatamente aislar a los perros que exponen los síntomas comunes o han sido diagnosticados con estos.

## Rabia

Es una enfermedad viral que se encuentra en la saliva del animal rabioso, 10 días antes de morir. Su transmisión se efectúa por medio de una mordedura o de la saliva que este en contacto con una herida, por leve que esta sea. La herida debe lavarse con abundante jabón antes de acudir al médico veterinario. El virus viaja por los nervios hasta el cerebro. El perro con rabia cambia de temperamento: si es amigable se vuelve irritable y si es tímido, se torna afectuoso. Le molesta la luz, no come ni toma agua, orina frecuentemente y presenta un fuerte deseo sexual. Después de unos días se paraliza o se vuelve furioso, por los que **hay dos tipos de rabia: paralítica y furiosa**. En el primer caso la boca está abierta, con el maxilar inferior caído, el perro no puede tragar y existe abundante salivación; en pocas horas muere. En la furiosa, las pupilas se encuentran dilatadas y el perro ataca todo lo que se mueve; la muerte sobreviene antes de 10 días. Por lo general, el periodo de incubación es de dos a tres semanas, aunque también puede ser de varios meses. **Un perro sospechoso no debe sacrificarse, porque entonces nunca se sabrá si estaba contagiado de rabia o no**, y todas las personas que tuvieron contacto con el deben de recibir la vacuna. **La rabia debe prevenirse por medio de la vacuna correspondiente.**

## **Bibliografía**

### **Libros:**

1. Joyce Blank I. (2008). *Enciclopedia de Perros de Raza*. Mexico: Trillas.
2. Birr Uschi Y Lind Ekard. (2010). *Gran Libro del Entrenamiento de tu perro*. España: Servilibro ediciones , S.A.

### **Sitios Web:**

1. Federation Cynologique InternaTionale (2011, Mayo). Disponible en: <http://www.fci.be/>
2. Federación Canina Mexicana (2011, Abril). Disponible en: <http://www.fcm.org.mx/>
3. American Kennel Club (2011, Abril). Disponible en: [http://www.akc.org/breeds/kerry\\_blue\\_terrier/](http://www.akc.org/breeds/kerry_blue_terrier/)
4. Kerry Blue Terrier Foundation (2011, Marzo) Disponible en: <http://www.kerryblues.info/>
5. La Cadiera (2011, febrero). Disponible en: <http://www.onlydog.com/lacadiera/>
6. Perrilandia (2011, Enero). Disponible en: <http://www.perrilandia.com>
7. Grifones Brabancon (Enero 2011). Disponible en: <http://www.griffondebruselas.com/>
8. Todo Pets (2010, Diciembre). Disponible en: [http://www.todopets.com/razas\\_perros/Grifon\\_de\\_Bruselas.html](http://www.todopets.com/razas_perros/Grifon_de_Bruselas.html)
9. La mascota.com Argentina (2010, Diciembre). Disponible en: [http://www.todopets.com/razas\\_perros/Grifon\\_de\\_Bruselas.html](http://www.todopets.com/razas_perros/Grifon_de_Bruselas.html)

### **Criaderos**

1. *La cadiera*, España. (2010,2011)
2. *Finneganswake*, Argentina. (2011)
3. *MtyTerriers*, México. (2010,2011)